Suite d'une castration.

N°. ~~[illegible]~~ 45.

le quatre decembre 1782 le nommé louis flandre agé de trente deux ans de flescourt diocese d'amiens, est entré à l'hopital de st. louis ayant une tumeur dans l'aine gauche qui lui etait survenu à la suite de l'amputation d'un testicule qui l'avait subit dans l'hospice du college de chirurgie, cette tumeur faisait bomber la cicatrice, il y avait un point rouge dans le milieu, le malade y ressentait beaucoup de douleurs, elles se propagerent dans la region iliaque gauche et ombilicale du meme coté, on emploia les relachants à l'exterieur, on lui en administra interieurement,
les douleurs augmentant avec beaucoup de vehemence, on se determina à lui faire prendre les bains, qui n'eurent pas plus de succes que les medicaments cy dessus enoncés; on lui fit faire usage interieurement des calmants, on en appliqua sur la tumeur, au sixieme bain. les douleurs ~~persistant~~ ayant augmenté ~~s~~ considerablement de plus en plus. la tumeur suppura, il en sortit beaucoup de matiere sanguinolente ~~tres~~ fetide, quoique la fluctuation n'en fut presque pas sensible
le malade se trouva un peu soulagé à l'exception de vives demangeaisons et cuissons qu'il y ressentait, la tumeur diminua beaucoup on le pansa suivant les regles de l'art, il eprouvait de la difficulté à uriner, ses urines etaient bourbeuses briquetées et infectoient à l'issue de leur sortie; elles etaient tres abondantes et il les rendait souvent.
les douleurs persistant toujours de plus en plus on lui a fait continuer l'usage des bains pendant quelque jours, malgré l'ulceration de la tumeur cancereuse sans aucun succes; au contraire les douleurs se propagerent dans toute l'etendue de la region epigastrique, et meme dans celle de l'hipocondre gauche, quelque temps apres elles se firent sentir dans le droit, en palpant ses differentes regions qui etaient tres douloureuses on y distinguait un corps qui offrait beaucoup de resistance,
les digestions etaient troublées, il vomissait de temps en temps toussait et crachait beaucoup, ses crachats etaient tres epais et purulents, il ressentait des douleurs dans la poitrine par fois assez vives, principalement du coté droit qui lui genait un peu la respiration, et avait par intervale des maux de tete assez violents,
le malade a toujours eut une fievre continüe qui jointe avec les douleurs de la tumeur l'affoiblissait considerablement ~~[illegible]~~ sur la fin de decembre les accidents cy dessus enoncés semblaient vouloir se calmer; le malade s'assoupissait de temps en temps, s'agitant beaucoup, la supuration de son ulcere cancereux etait tres abondante,
le premier janvier 1783 on lui a fait cesser l'usage des bains il l'avaient si fort affoiblis qu'il ne pouvait plus y rester sans perdre connaissance, le 6 les douleurs ont tourmenté le malade plus qu'a l'ordinaire il lui occasionnerent des coliques par interval tres violentes qui le priverent du sommeil,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 18 d. 4 n° 45

il n'allait à la selle qu'à force de remede et ne pouvait se coucher sur le dos ni sur
le coté droit gauche sans beaucoup souffrir, mais lorsqu'il etait sur le droit
il ne souffrait presque pas, le ventre qui jusqu'alors avait paru ne pas faire des progres
en a fait beaucoup. etant toujours douloureux, le 15 les coliques se renouvelerent
violamment, la supuration devint moins abondante, la toux avait beaucoup
augmenté, les crachats n'etaients plus si abondants, ni purulents, le 20 la fievre
augmenta beaucoup;
le malade vomissait ce qu'il prenait, les douleurs de la poitrine etaient plus vives
il respirait plus difficilement et toussait beaucoup plus. souvent ce avait pris
beaucoup d'accroissement, etant tres douloureux, surtout vers les regions epigastrique
hipocondriaque droite et gauche, mais les plus vives se faisaient ressentir, vers
les regions iliaque gauche, et ombilicale du meme coté, la fluctuation du
ventre est devenu tres sensible, la supuration de l'ulcere cancereux avait
beaucoup diminué, elles repandait un odeur cadavereuse, enfin le 22 les
les accidents ont augmentés considerablement. le ventre a pris bcit beaucoup
d'accroissement; toutes les parties malades qui jusqu'alors lui avaient été tres douloureuse.
apeine lui etaient elle sensible, la fievre joint à l'assoupissement
au transport et aux convulsions, l'on conduit au tombeau
à l'ouverture de la tete, la dure mere etait peu adherente il y avait sur sa
surface des points de supuration, principalement le long du sinus
longitudinal superieur. tout le cerveau et le cervelet, n'offrait n'offraient
rien de remarquable
à l'ouverture de la poitrine le poumon gauche s'est trouvé dans l'etat naturel
il etait seulement un peu adherent à la plevre dans deux pouces de son etendue
mais la cavité droite etait remplie de pus. et le poumon etait presque tout
tombé en fonte. le coeur et les vaisseaux qui en partent etaient dans l'etat
le plus ordinaire
le bas ventre ouvert il y avait epanchement d'un fluide de couleur sanguinolente
qui repandait une odeur tres desagreable, on a evalué sans
quantité à 6 pintes,
l'epiploon etait adherent au peritoine tres engorgé et squirreux principalement
du coté de la grande courbure de l'estomac, où il formait une tumeur dure
squirreuse et inegale de la grosseur d'un oeuf de poule, il formait encore
une tumeur considerable, situé dans la region iliaque gauche qui se
prolongeant dans l'excavation du petit bassin, en dejettant l'intestin rectum
a droite, tout le reste de son etendue etait tres engorgé quainsi que les vaisseaux
qui s'y distribuent,
les glandes du mesentere etaient singulierement tumefiés ilé il en avaient
plusieurs qui egalaient la grosseur d'une noix

[right margin:]
s'y etait manifesté
tous
pan
disti
tu m
ayan
les
le
pa
et
lo
le
qu
le
q
q
o
r
e
la
v
p
a
f
c
e
le
t
de
w
d

tous les intestins etaient sains la portion transverse du colon etait adherente au -
pancreas, lequel presentait un volume enorme, ~~[illegible]~~ et inegale que l'on
distinguait tres bien du vivant du malade, il renfermait un nombre considerable de
tumeurs, les unes plus grosses que les autres. plusieurs se sont trouvées ouvertes -
ayant laissé echaper la matiere quelles contenaient, laquelle s'etait melé avec
le fluide epanché dans le bas ventre;
le rein du coté gauche et la rate se sont trouvé confondu avec cette ~~[illegible]~~
pancreatique quoique ses deux visceres fussent tres sains; le rein du coté droit
etait dans l'etat ordinaire.
l'orifice pilorique de l'estomac etait si retrecie qu'a peine aurait il permis -
le passage d'un haricot il avait acquis beaucoup d'epaisseur, et une solidite
qui approchait de celle du cartilage, le reste de l'estomac n'avait rien de remarquable
le foie quoique tout obstrue n'excede pas son volume ordinaire, les tumeurs
quil ~~[illegible]~~ contenaient etaient ~~fut~~ remplie de matiere rougeatre, melé de concretions; on
en comptait un nombre considerable, mais les plus volumineuses se -
remarquait sous la face inferieure de son moien lobe, la vesicule du fiel
etait tres dilaté par la presence de la bile
la vessie etait tres retrecie ~~[illegible]~~ colonne, le testicule ainsi que les
vaisseaux spermatiques et le canal deferent ~~[illegible]~~ -
ne presentaient rien de remarquable,
au contraire ce qui reste du cordon du coté opposé est d'un volume considerable
tout squirreux, renfermant dans son interieur une matiere rougeatre de
consistance epaisse, a deux travers de doigt de la section il est un peu deprimé
et reprend aussitot son premier volume jusqu'a pres de son origine
le prolongement du peritoine qui envelopait le cordon lui etait tres adherente
et avait acquis beaucoup d'epaisseur, la cavite du [interieur] testicule ampoule est remplie
de tissu celulaire tres engorgé, d'ou decoulait par l'ulcere cancereux qui s'y etait manifesté
un pus tres fetide, noiratre, et les membranes par l'engorgement de toutes
ses parties ont acquis beaucoup de densité.